

特殊な7次方程式の代数的解法

佐藤 勲

1 はじめに

4次方程式までは解の公式があり、代数的に解けるが、5次方程式以上は一般には代数的に解けないことはよく知られている。しかし、全く解けないということではなく、解のガロア群が n 次の対称群の可解な部分群である場合には、代数的に解ける。最も簡単なものは、因数分解できるタイプのものである。因数分解できないタイプの場合で、代数的に解ける場合について述べる。

2 7次方程式の変形

一般の7次方程式

$$ax^7 + bx^6 + cx^5 + dx^4 + ex^3 + fx^2 + gx + h = 0 \quad (1)$$

は、

$$y = x + \frac{b}{7a} \quad (2)$$

と置き換えると、6次項の消えた標準形

$$y^7 + py^5 + qy^4 + ry^3 + sy^2 + ty + u = 0 \quad (3)$$

に移る。ここで、

$$\begin{cases} p = \frac{-3b^2 + 7ac}{7a^2} \\ q = \frac{10b^3 - 35abc + 49a^2d}{49a^3} \\ r = \frac{-15b^4 + 70ab^2c - 196a^2bd + 343a^3e}{343a^4} \\ s = \frac{12b^5 - 70ab^3c + 294a^2b^2d - 1029a^3be + 2401a^4f}{2401a^5} \\ t = \frac{-5b^6 + 35ab^4c - 196a^2b^3d + 1029a^3b^2e - 4802a^4bf + 16807a^5g}{16807a^6} \\ u = \frac{6b^7 - 49ab^5c + 343a^2b^4d - 2401a^3b^3e + 16807a^4b^2f - 117649a^5bg + 823543a^6h}{823543a^7} \end{cases} \quad (4)$$

である。

3 代数的解 1

もし、 $u = 0$ という関係があれば、因数分解できて

$$y(y^6 + py^4 + qy^3 + ry^2 + sy + t) = 0 \quad (5)$$

となるから、直ちに

$$x = -\frac{b}{7a}, -\frac{b}{7a} + y_1, -\frac{b}{7a} + y_2, -\frac{b}{7a} + y_3, -\frac{b}{7a} + y_4, -\frac{b}{7a} + y_5, -\frac{b}{7a} + y_6 \quad (6)$$

という解が得られる。ただし、 $y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ は、6 次方程式

$$y^6 + py^4 + qy^3 + ry^2 + sy + t = 0 \quad (7)$$

の 6 根である。

4 代数的解 2

$y = w_1 + w_2$ とおくと、

$$\begin{aligned} y^7 + py^5 + qy^4 + ry^3 + sy^2 + ty + u = \\ \{p + 7w_1w_2\}(w_1 + w_2)^5 + q(w_1 + w_2)^4 + \{r - 14(w_1w_2)^2\}(w_1 + w_2)^3 + s(w_1 + w_2)^2 \\ \{t + 7(w_1w_2)^3\}(w_1 + w_2) + \{w_1^7 + w_2^7 + u\} = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

となるので、

$$\begin{cases} p + 7w_1w_2 = 0 \\ q = 0 \\ r - 14(w_1w_2)^2 = 0 \\ s = 0 \\ t + 7(w_1w_2)^3 = 0 \\ w_1^7 + w_2^7 + u = 0 \end{cases} \quad (9)$$

という関係があれば解ける。1 番目の式から

$$w_1w_2 = -\frac{p}{7} \quad (10)$$

を 3 番目と 5 番目の式に代入して w_1, w_2 を消去すると、

$$r = \frac{p^2}{7}, t = \frac{p^3}{49} \quad (11)$$

これと $q = s = 0$ が同時に成立することが解けるための条件である。この関係式が成立するとき、 w_1^7, w_2^7 は

$$z^2 + uz - \left(\frac{p}{7}\right)^7 = 0 \quad (12)$$

の 2 根であるから、

$$w_1^7, w_2^7 = z = -\frac{u}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{u}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{7}\right)^7} \quad (13)$$

これより、

$$y^7 + py^5 + \frac{2p^2}{7}y^3 + \frac{p^3}{49}y + u = 0 \quad (14)$$

の形となった方程式の解は、

$$x_n = -\frac{b}{7a} + \zeta_n \sqrt[7]{-\frac{u}{2} + \sqrt{\left(\frac{u}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{7}\right)^7}} + \zeta_{-n} \sqrt[7]{-\frac{u}{2} - \sqrt{\left(\frac{u}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{7}\right)^7}} \quad (15)$$

ただし、 ζ_n は、1 の 7 乗根で、

$$\zeta_n = e^{2n\pi i/7} = \cos \frac{2n\pi}{7} + i \sin \frac{2n\pi}{7} \quad (16)$$